



帕博西尼安全用药须知

(请仔细阅读本须知，按本须知或在医生指导下用药)

【药品商品名】

Parcini，品名：帕博西尼，通用名：Palbociclib。

【适应症】

Palbociclib是一个激酶抑制剂适用与来曲唑联用为有雌激素受体(ER)-阳性，人表皮生长因子受体2(HER2)-阴性晚期乳癌绝经后妇女的治疗作为初始基于内分泌治疗对其转移疾病。这个适应证是根据无进展生存(PFS)在加速批准下被批准。剂型批准此适应证可能取决于在验证性试验中临床获益的证明和描述。

【剂量和给药方法】

1、给药方法

Palbociclib 胶囊是与食物与来曲唑联用口服。

- 推荐开始剂量：125mg 每天一次与食物服用共 21 天接着 7 天不治疗。
- 建议根据个体安全性和耐受性中断和/或剂量减低给药。

2、剂型规格

- 胶囊，125mg、100mg、75mg。

3、禁忌症：无。

【警告和注意事项】

- **血液学**：可能发生中性粒细胞减少。监视完全血细胞计数 Palbociclib 治疗开始前和在每个疗程开始，以及在头两个疗程第 14 天，和当临床指示时。
- **感染**：监视体征和症状和适当时不给药。
- **胚胎胎儿毒性**：可能致胎儿危害。忠告患者对胎儿潜在风险和使用有效避孕。

【不良反应】

最常见不良反应(发生率 $\geq 10\%$)包括：中性粒细胞减少、白细胞减少、疲乏、贫血、上呼吸道感染、恶心、口炎、脱发、腹泻、血小板减少、食欲减退、呕吐、乏力、周围神经病变和鼻衄。



Tongmeng (Lao) Pharmaceutical & Food Co., Ltd.
东盟（老挝）制药与食品有限公司

【储存方法】

遮光、阴凉干燥处。